



Consigli per il migliore utilizzo dei prodotti L. Gobbi s.r.l sulla coltura

Vedere anche la scheda Generale FRUTTICOLTURA

EPOCA	PRODOTTO	DOSE	Somministrazione	NOTE
Da allegazione ad invaiatura	Alga Special +Sprühdünger tipo 5 (o Sprühdünger tipo 30)	2 l/ha 750 g/ha (750 g/ha)	Per via fogliare	Ogni 15 giorni
Pre fioritura	Alga Special +Boro LG 25 +Sprühdünger tipo 26	2 l/ha 2,5 l/ha 750 g/ha	Per via fogliare	Per predisporre la pianta ad una migliore allegazione
A inizio fioritura	Alga Special +Boro LG 25 +Sprühdünger tipo 26	2 l/ha 2,5 l/ha 750 g/ha	Per via fogliare	Per migliorare l'allegazione
A caduta petali	Alga Special +Boro LG 25 +Sprühdünger tipo 26	2 l/ha 2,5 l/ha 750 g/ha	Per via fogliare	Per migliorare l'allegazione
A scamicatura e poi ogni 15 gg per almeno 4 volte	Alga Ca	2,5-3 l/ha	Per via fogliare	Per migliorare la consistenza della polpa
Immediatamente prima o all'inizio dello stadio di lignificazione del nocciolo	Maxim	12-15 cp/ha	Per via fogliare	Incremento della pezzatura dei frutti

Al posto della miscela

Alga Special	2 l/ha
+ Boro LG 25	2,5 l/ha

Si può impiegare

Alga Special	2 l/ha
+ Boro 10 LG	1 l/ha

Al posto dell'Alga Special si può impiegare il nuovo formulato **SEAWEED MIX**

oppure
oppure

Alga Mix BMg	3 l/ha
---------------------	---------------

Alga Special	2 l/ha
+ Boro 21 PG	1 kg/ha

