



## Consigli per il migliore utilizzo dei prodotti L. Gobbi s.r.l sulla coltura

EPOCA	PRODOTTO	DOSE	Somministrazione	NOTE
PRIMA DEL TRAPIANTO	<b>LG 81</b>	<b>5 l/ha</b>	Alla preparazione del terreno	Migliora l'attività biologica del terreno e quella radicale. Migliora l'assorbimento del calcio.
	<b>Stimolante 66f</b>	<b>20 ml/hl</b>	Immersione delle radici	Per evitare la crisi del trapianto. Immergere le piantine per circa 12 ore. Anche in miscela con i trattamenti per la prevenzione dei marciumi radicali. Per le piantine frigo-conservate si consiglia di toglierle dal frigo almeno 1-2 giorni prima del trattamento.
DOPO IL TRAPIANTO	<b>Stimolante 66f + Gerfos-k</b>	<b>20 ml/hl 200 ml/hl</b>	Per via fogliare	Ripetere ogni 15-20 giorni.
	<b>Alga Special</b>	<b>150 ml/hl</b>	Per via radicale	Per favorire un accrescimento pronto ed uniforme della pianta, creando le premesse per una buona fioritura.
25-30 GG DOPO IL TRAPIANTO E POI OGNI 20-25 GG.	<b>LG 81</b>	<b>1 l/ha</b>	Per via radicale	Migliora l'attività biologica del terreno e quella radicale. Migliora l'assorbimento del calcio. Riduce lo stress determinato da trattamenti antiparassitari.
ALLA RIPRESA VEGETATIVA	<b>Anticlor Fe WP6 G + Alga Special</b>	<b>100 g/hl 150 ml/hl</b>	Per via radicale	Per un paio di volte
DOPO QUALCHE GIORNO	<b>Alga Special + Sprühdünger tipo 26</b>	<b>150 ml/hl 50 g/hl</b>	Per via radicale	Per un paio di volte
POST-FIORITURA (Inizio caduta dei petali)	<b>Auxiger + Alga Special</b>	<b>50-70 150 ml/hl</b>	Per via fogliare	Per favorire l'allegagione.
AD ALLEGAGIONE AVVENUTA	<b>Stimolante 66f + Alga special + Sprühdünger tipo 5</b>	<b>20 ml/hl 150 ml/hl 50 g/hl</b>	Per via fogliare	Per favorire un rapido ed uniforme accrescimento del frutticino esaltandone le caratteristiche organolettiche.
	<b>Alga Special + Sprühdünger tipo 5</b>	<b>150 ml/hl 50 g/hl</b>	Per via radicale	

Nota: **L'Auxiger** si può usare anche per via radicale (200 ml/1000 m<sup>2</sup>) Effettuare la prima applicazione quando i primi frutti cominciano a virare di colore. Ripetere ogni 8-10 giorni fino alla fine del ciclo.

Carenze: Calcio

EPOCA	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3	
Durante l'accrescimento dei frutti. (Nelle prime fasi della crescita)	<b>Alga Special TRB 124</b> 500 ml/hl 1,5 kg/hl oppure	<b>Alga Special + Calcium 44 LG</b> 500 ml/hl 300-400 g/hl oppure	<b>Alga Ca</b> 2 l/hl	Per via radicale
Durante l'accrescimento dei frutti. (Verso la maturazione)	<b>Alga Special TRB 124</b> 150 ml/hl 400 g/hl oppure	<b>Alga Special + Calcium 44 LG</b> 150 ml/hl 80-100 g/hl oppure	<b>Alga Ca</b> 500 ml/hl	Per via fogliare

