



## Consigli per il migliore utilizzo dei prodotti L. Gobbi s.r.l sulla coltura

### VEDERE ANCHE LA SCHEDA GENERALE ORTICOLTURA

EPOCA	PRODOTTO	DOSE	Somministrazione	NOTE
PRIMA DEL TRAPIANTO	<b>Alga Special</b> <b>+ Gerfos-K</b>	<b>2 l/1000 m<sup>2</sup></b> <b>1 l/1000 m<sup>2</sup></b>	Fertirrigazione	Per predisporre la pianta ad una rapida ripresa e ridurre la crisi tipica del trapianto
OGNI 5-7 GIORNI FINO ALLA RACCOLTA	<b>Alga Special</b> <b>+ Sprühdünger tipo 27</b> <b>+ Gerfos-K</b>	<b>150 ml/hl</b> <b>50 g/hl</b> <b>50 ml/hl</b>	Per via fogliare	Per accelerare lo sviluppo della pianta incrementandone il contenuto in sostanza secca.

Carenze: Per prevenire l'imbrunimento e la necrosi marginale delle foglie

EPOCA	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3	
(1° trattamento) 7-10 giorni dopo il trapianto	<b>Alga Special</b> 150 ml/hl <b>TRB 124</b> 400 g/hl oppure	<b>Alga Special</b> 150 ml/hl <b>+ Calcium 44 LG</b> 150 g/hl oppure	<b>Alga Ca</b> 500 ml/hl	Per via fogliare.
(2° trattamento) 7-10 giorni dopo il 1° trattamento	<b>Alga Special</b> 150 ml/hl <b>TRB 124</b> 800 g/hl oppure	<b>Alga Special</b> 150 ml/hl <b>+ Calcium 44 LG</b> 200g/hl oppure		Con Alga Ca sono sufficienti due soli trattamenti
(3° trattamento) 8 giorni dopo il 2° trattamento	<b>Alga Special</b> 150 ml/hl <b>TRB 124</b> 1500 g/hl oppure	<b>Alga Special</b> 150 ml/hl <b>+ Calcium 44 LG</b> 250-300 g/hl oppure	<b>Alga Ca</b> 500 ml/hl	

### Radicchio

Al posto della **Alga Special 150 ml/hl** è possibile impiegare **Stimolante 66f 20 ml/hl**  
In questo caso, sospendere il trattamento 7 giorni prima della raccolta

