



Consigli per il migliore utilizzo dei prodotti L. Gobbi s.r.l sulla coltura

VEDERE ANCHE LA SCHEDA GENERALE ORTICOLTURA

EPOCA	PRODOTTO	DOSE	Somministrazione	NOTE
TRAPIANTO A DIMORA	Alga Special	5 l/ha	Fertirrigazione	Per una pronta ripresa e permettere alla piantina di superare la crisi di trapianto.
	Stimolante 66f + Gerfos-K	150 ml/ha 300 ml/ha	Per via fogliare	Ripetere ogni 15-20 giorni
POST-TRAPIANTO / PREFIORITURA	Stimolante 66f + Alga Special + Sprühdünger tipo 27	150 ml/ha 1 l/ha 750 g/ha	Per via fogliare	Per favorire la crescita rapida ed equilibrata delle piante. Per migliorare la germinabilità del polline e per predisporre la pianta ad una buona allegazione. Anche in abbinamento ai trattamenti antiparassitari. Ripetere il trattamento dopo 8-10 giorni
ALLEGAGIONE	Auxiger*	50-70 ml/hl	Da metà fioritura, irrorare con un getto molto nebulizzato tutta la pianta possibilmente privilegiando i grappoli fiorali.	Per aumentare il numero di frutti allegati, per favorire l'ingrossamento dei frutti e per ottenere una maturazione più uniforme ed equilibrata.
ACCRESIMENTO FRUTTI	Stimolante 66f + Alga Special + Sprühdünger tipo 5	150 ml/ha 1 l/ha 750 g/ha	Per via fogliare	Ripetere il trattamento ogni 8-10 giorni.

Nota : L'**Auxiger** si può usare anche per via radicale (200 ml/1000 m²) Effettuare la prima applicazione quando le piante sono al terzo palco di pomodori e il diametro medio dei frutti sia all'incirca come quello di un uovo di gallina. Ripetere ogni 8-10 giorni fino alla fine del ciclo.

Carenze: Per la prevenzione del marciume apicale.

EPOCA	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3	
Qualche giorno dopo il trattamento allegante	Alga Special 2 l/ha TRB 124 5-6 kg/ha oppure	Alga Special 2 l/ha + Calcium 44 LG 1 kg/ha oppure	Alga Ca 3 l/ha	Per via fogliare.

