



Consigli per il migliore utilizzo dei prodotti L. Gobbi s.r.l sulla coltura

Vedere anche la scheda Generale FRUTTICOLTURA

EPOCA	PRODOTTO	DOSE	Somministrazione	NOTE
Pre fioritura	Alga Special + Boro LG 25	2 l/ha 2,5 l/ha	Per via fogliare	per migliorare la allegazione
Inizio fioritura	Alga Special + Boro LG 25	2 l/ha 2,5 l/ha	Per via fogliare	per migliorare la allegazione
A caduta petali	Alga Special + Boro LG 25	2 l/ha 2,5 l/ha	Per via fogliare	per migliorare la allegazione
Ad allegazione avvenuta	Alga Special + Sprühdünger tipo 26	2 l/ha 750 g/ha	Per via fogliare	Effettuare almeno tre trattamenti a distanza di 7-8 giorni.
Fino alla invaiatura	Alga Special + Sprühdünger tipo 5	2 l/ha 750 g/ha	Per via fogliare	I trattamenti proseguiranno distanziati di 8-10 per consentire di migliorare la colorazione, la serbevolezza, la consistenza e le caratteristiche organolettiche del frutto nonché il contenuto in sostanza secca
40 giorni prima della raccolta	Alga Ca	2 l/ha		1-2 trattamenti per contenere la rugginosità e il cracking del frutto.

Al posto della miscela

**Alga Special 2 l/ha
+ Boro LG 25 2,5 l/ha**

Si può impiegare

**Alga Special 2 l/ha
+ Boro 10 LG 1 l/ha**

oppure

Alga Mix BMg 3 l/ha

