



Consigli per il migliore utilizzo dei prodotti L. Gobbi s.r.l sulla coltura

VEDERE ANCHE LA SCHEDA GENERALE ORTICOLTURA

1. PIANTINE A CRESCITA "LENTA" (es.: peperone, sedano).

I seguenti interventi presuppongono una normale dotazione di elementi nutritivi ed un pH ottimale nel substrato di coltivazione. Nell'eventualità aggiungere il **Dünger 40** alla dose di 3 kg per m³ di substrato.

È, in ogni caso, sempre consigliabile l'aggiunta di **1 l di Gerfos-K**.

EPOCA	PRODOTTO	DOSE	Somministrazione	NOTE
1° FASE: DALLA GERMINAZIONE ALLA PRIMA FOGLIA VERA	Alga Special + Dünger 40 + TRB 124	400 ml/1000 m² 2 kg/1000 m² 1 kg/1000 m²	Per via radicale	2 volte per settimana per trattamenti giornalieri ridurre il dosaggio proporzionalmente.
	Stimolante 66f + Gerfos-K	20 ml/hl 50 ml/hl	Per via fogliare	Trattare settimanalmente
2° FASE: DALLA PRIMA FOGLIA VERA A CIRCA 15 GIORNI PRIMA DEL TRAPIANTO	Dünger 40 + Gerhumín	3 kg/1000 m² 500 ml/1000 m²	Per via radicale	2 volte per settimana per trattamenti giornalieri ridurre il dosaggio proporzionalmente.
	Stimolante 66f + Gerfos-K	20 ml/hl 50 ml/hl	Per via fogliare	Trattare settimanalmente
3° FASE: DA CIRCA 15 GIORNI PRIMA DEL TRAPIANTO	Dünger 10 (o Dünger 60) + Gerhumín	3 kg/1000 m² (3 kg/1000 m ²) 500 ml/1000 m²	Per via radicale	2 volte per settimana per trattamenti giornalieri ridurre il dosaggio proporzionalmente.
	Stimolante 66f + Gerfos-K	20 ml/hl 50 ml/hl	Per via fogliare	Trattare settimanalmente

2. PIANTINE A CRESCITA "RAPIDA" (es.: pomodoro, lattuga, ecc.).

I seguenti interventi presuppongono una normale dotazione di elementi nutritivi ed un pH ottimale nel substrato di coltivazione.

Nell'eventualità aggiungere il **Dünger 50** alla dose di 3 kg per m³ di substrato.

È, in ogni caso, sempre consigliabile l'aggiunta di **1 l di Gerfos-K**.

EPOCA	PRODOTTO	DOSE	Somministrazione	NOTE
1° FASE: DALLA GERMINAZIONE ALLA PRIMA FOGLIA VERA	Alga Special + Dünger 40 + TRB 124	400 ml/1000 m² 1 kg/1000 m² 1 kg/1000 m²	Fertirrigazione	2 volte per settimana per trattamenti giornalieri ridurre il dosaggio proporzionalmente.
	Stimolante 66f + Gerfos-K	20 ml/hl 50 ml/hl	Per via fogliare	Trattare settimanalmente
2° FASE: DALLA PRIMA FOGLIA VERA A CIRCA 15 GIORNI PRIMA DEL TRAPIANTO	Dünger 50 + Gerhumín	3 kg/1000 m² 500 ml/1000 m²	Per via radicale	2 volte per settimana per trattamenti giornalieri ridurre il dosaggio proporzionalmente.
	Stimolante 66f + Gerfos-K	20 ml/hl 50 ml/hl	Per via fogliare	Trattare settimanalmente
3° FASE: DA CIRCA 15 GIORNI PRIMA DEL TRAPIANTO	Dünger 30 + Gerhumín	3 kg/1000 m² 500 ml/1000 m²	Per via radicale	2 volte per settimana per trattamenti giornalieri ridurre il dosaggio proporzionalmente.
	Stimolante 66f + Gerphos-K	20 ml/hl 50 ml/hl	Per via fogliare	Trattare settimanalmente

