



## Consigli per il migliore utilizzo dei prodotti L. Gobbi s.r.l sulla coltura

VEDERE ANCHE LA SCHEDA GENERALE ORTICOLTURA

EPOCA	PRODOTTO	DOSE	Somministrazione	NOTE
TRAPIANTO A DIMORA	<b>Alga Special</b>	<b>2 l/1000 m<sup>2</sup></b>	Fertirrigazione	Per una pronta ripresa e permettere alla piantina di superare la crisi di trapianto.
	<b>Stimolante 66f + Gerfos-K</b>	<b>20 ml/hl 300 ml/hl</b>	Per via fogliare	Ripetere ogni 15-20 giorni
NEL PERIODO CHE SEGUE	<b>Stimolante 66f + Sprühdünger tipo 27 + Gerhumin</b>	<b>20 ml/hl 50 g/hl 50 ml/hl</b>	Per via fogliare	Per favorire la crescita rapida ed equilibrata delle piante. Intervenire a cadenza settimanale.
FIORITURA	<b>Auxiger + Alga Special</b>	<b>50-70 ml/hl 100 ml/hl</b>	Per via fogliare	Per favorire l'allegagione. Intervenire durante la fioritura, ogni 8-10 giorni.
4-5 GIORNI DOPO	<b>Stimolante 66f + Alga Special + Sprühdünger tipo 26 + Boro LG 25</b>	<b>20 ml/hl 100 ml/hl 50 g/hl 400 ml/hl</b>	Per via fogliare	
	<b>Sprühdünger tipo 26 + Boro LG 25 + Gerhumin</b>	<b>2 kg/1000 m<sup>2</sup> 4 l/1000 m<sup>2</sup> 1 l/1000 m<sup>2</sup></b>	Per via radicale	
ALLEGAGIONE / INIZIO MATURAZIONE	<b>Auxiger + Seaweed Mix + Sprühdünger tipo 5</b>	<b>50-70 ml/hl 200 ml/hl 50 g/hl</b>	Per via fogliare	Per favorire l'ingrossamento dei frutti ed una maturazione più uniforme ed equilibrata.
	<b>Fluidünger Più + Gerhumin</b>	<b>10 l/1000 m<sup>2</sup> 1 l/1000 m<sup>2</sup></b>	Per via radicale	
INIZIO RACCOLTA	<b>Sprühdünger tipo 5 + Gerhumin</b>	<b>100 g/hl 50 ml/hl</b>	Per via fogliare	Per soddisfare le elevate esigenze di potassio che la pianta di zucchini ha in questa fase. In mancanza di tali apporti ci sarebbero gravi ripercussioni qualitative sulla produzione.
	<b>Fluidünger Più + Gerhumin</b>	<b>10 l/1000 m<sup>2</sup> 1 l/1000 m<sup>2</sup></b>	Per via radicale	

\*Nota: L'**Auxiger** si può usare anche per via radicale (200 ml/1000 m<sup>2</sup>) da quando compaiono i primi fiori chiusi. Ripetere ogni 7 giorni fino alla fine del ciclo.

