



Consigli per il migliore utilizzo dei prodotti L. Gobbi s.r.l sulla coltura

VEDERE ANCHE LA SCHEDA GENERALE ORTICOLTURA

EPOCA	PRODOTTO	DOSE	Somministrazione	NOTE
TRAPIANTO A DIMORA	Alga Special	2 litri/1000 m²	Fertirrigazione	Per una pronta ripresa e permettere alla piantina di superare la crisi di trapianto.
	Stimolante 66f + Gerfos-K	20 ml/hl 50 ml/hl	Per via fogliare	Ripetere ogni 15-20 giorni
NEL PERIODO CHE SEGUE SINO ALL'INIZIO FIORITURA	Stimolante 66f + Alga Special + Sprühdünger tipo 27	20 ml/hl 100 ml/hl 50 g/hl	Per via fogliare	Per favorire la crescita rapida ed equilibrata delle piante. Intervenire a cadenza settimanale.
	Auxiger	50-70 ml/hl	Per via fogliare	Per favorire l'allegagione.
	Stimolante 66f + Alga Special + Sprühdünger tipo 26 + Boro LG 25	20 ml/hl 100 ml/hl 50 g/hl 400 ml/hl	Per via fogliare	
	Fluidünger 70 + Gerhumín	10 l/1000m² 1 l/1000 m²	Per via radicale	
	Sprühdünger tipo 26 + Boro LG 25 + Gerhumín	2 kg/1000 m² 5 l/1000 m² 1 l/1000 m²	Per via radicale	
Dopo 7- 10 giorni	Sprühdünger tipo 5 + Gerhumín + TRB 124	2 kg/1000 m² 1 l/1000 m² 6 kg/1000 m²	Per via radicale	Per evitare l'insorgere della fisiopatia nota come "Disseccamento apicale e marciume a carico di foglie e frutti.
ALLEGAGIONE	Auxiger*	50-70 ml/hl	Per via fogliare	Per favorire l'ingrossamento dei frutti ed una maturazione più uniforme ed equilibrata,
Dopo 3- 4 giorni	Sprühdünger tipo 5 + Gerhumín + TRB 124	2 kg/1000 m² 1 l/1000 m² 6 kg/1000 m²	Per via radicale	
Dopo 7- 10 giorni	Sprühdünger tipo 5 + Gerhumín	2 kg/1000 m² 1 l/1000 m²		

*

Nota : **L'Auxiger** si può usare anche per via radicale (200 ml/1000 m²) da quando i frutti iniziano a riempirsi . Ripetere ogni 8- 10gg fino alla fine del ciclo

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

