


Schede nutrizionali

Consigli per il migliore utilizzo dei prodotti L. Gobbi s.r.l sulla coltura

PERO



| EPOCA | PRODOTTO | DOSE | Somministrazione | NOTE |
|--|--|--|--|---|
| Primavera precoce | LG 81 + Anticlor Fe WP6G | 6 l/ha + 30-50 g/pianta | per via radicale | Migliora l'attività biologica del terreno e quella radicale. Migliora l'assorbimento del calcio e del ferro. |
| ogni mese (o a metà dose ogni 15 giorni) | LG 81 | 1 l/ha | in fertirrigazione sulla fila | |
| <i>oppure</i> metà estate | | 6 l/ha | <i>Intera superficie coltivata</i> | |
| Mazzetti affioranti | Stimolante 66f + Alga CMZ + Boron 21 PG | 300 ml/ha 3 l/ha 1 kg/ha | Per via fogliare | Protezione della fioritura dalle condizioni climatiche avverse |
| Mazzetti divaricati | Stimolante 66f + Alga CMZ + Boron 21 PG Sprühdünger 26 | 300 ml/ha 2 l/ha 1 kg/ha 750 g/ha | Per via fogliare | Preparazione ad una migliore allegagione |
| 10-20 % di fiori aperti | AF 96 + Alga Mix BMg Sprühdünger 26 | 800-1200 ml/ha 3 l/ha 750 g/ha | Per via fogliare | Incremento di allegagione e formazione del frutticino secondo varietà. |
| Abate Fété! | Effettuare un primo trattamento a bottoni bianchi con 1 l/ha di AF 96 seguito a 10-20 % di fiori aperti da un trattamento con Progerbalin a 200-300 ml/ha e ripetendo 2-3 giorni dopo allo stesso dosaggio. Oppure: Effettuare un trattamento con AF 96 a 10-20 % di fiori aperti ripetendo a 50% di fiori aperti. | | | |
| <i>oppure:</i> 25% di fiori aperti | Progerbalin | 60-80 ml/hl (o 30-40 ml/hl se si fanno due trattamenti) | Per via fogliare | Incremento di allegagione. Effettuare il secondo trattamento 2-3 giorni dopo il primo. |
| <i>oppure:</i> 30-40% di fiori aperti | Gerlagib LG | 80-100 ml/hl (o 30-50 ml/hl se si fanno due trattamenti) | Per via fogliare | |
| A caduta petali | Stimolante 66f + Sprühdünger 26 + Alga Mix BMg | 300 ml/ha 750 g/ha 3 l/ha | Per via fogliare | Formazione del frutticino. |
| 2-3 settimane dopo la piena fioritura | Platina | 1,5 l/ha | Per via fogliare | Maggiore accrescimento e sviluppo del frutto |
| Metà Maggio | Alga Special + Sprühdünger 26 | 2 l/ha 750 g/ha | Per via fogliare | |
| Fine Maggio | Sprühdünger 26 | 750 g/ha | Per via fogliare | |
| Inizio Giugno | Alga Special + Sprühdünger 26 | 2 l/ha 750 g/ha | Per via fogliare | |
| Metà Giugno Fine Giugno Inizio Luglio | Alga Special + Sprühdünger 5 + Zinc 10 LG | 2 l/ha 750 g/ha 1,5 kg/ha | Per via fogliare | Maggiore colorazione e aumento della consistenza della polpa, migliore conservabilità e aumento della differenziazione delle gemme a fiore. |
| Da fine Luglio | Alga Special + Sprühdünger 5 | 3 l/ha 750 g/ha | Per via fogliare | ogni quindici giorni fino a poco prima della raccolta in modo da migliorare la conservabilità dei frutti. |
| 7-20 giorni prima della raccolta | Obsthormon 24a | 250-500 ml/ha secondo varietà | Per via fogliare | Prevenzione cascola preraccolta. |
| Subito dopo la raccolta | Alga Special + Boron 21 PG + Urea | (3 l/ha) (1 kg/ha) | Per via fogliare | Si favorisce l'accumulo per una pronta disponibilità nelle primissime fasi della stagione successiva. |
| Autunno | LG 81 | 6 l/ha | per via radicale | Migliora l'attività biologica del terreno e quella radicale. Migliora l'assorbimento e l'accumulo dei nutrienti. |

Note ai prodotti elencati: **Boron 21 PG** (1 kg/ha) può essere sostituito da **Boro LG 25** (2,5 l/ha) o da **Boro 10 LG** (1 l/ha).

La miscela **Alga Special** (2-3 l/ha) + **Boron 21 PG** (1 kg/ha) può essere sostituita da **Alga Mix BMg** (3 l/ha).

Alga Special può essere sostituita da **Seaweed Mix** (stessi dosaggi).

SPRÜHDÜNGER TIPO 5 può essere sostituito da **SPRÜHDÜNGER TIPO 30** che possiede un più elevato contenuto di potassio.

SPRÜHDÜNGER TIPO 26 (fogliare) può essere sostituito da **DÜNGER 70 (radicale)**.

Inoltre sulla brochure della linea **Biotrissol** possono essere reperiti numerosi altri prodotti che trovano valido impiego sulla coltura. La linea **Biotrissol** si distingue per possedere come base, una matrice organica (aminoacidi e estratti vegetali fermentati) e per la possibilità per la maggior parte dei prodotti, di poter essere utilizzati anche in **agricoltura biologica**.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.



I- 16013 Campo Ligure (GE) Via Vallecaldà, 33
Tel.: +39 010 920 395 Fax : +39 010 921 400
e-mail: info@lgobbi.it http://www.lgobbi.it
SPECIALITÀ PER L'AGRICOLTURA

l. gobbi s.r.l.



Conc. E. Gerlach GmbH - Germania