



## Consigli per il migliore utilizzo dei prodotti L. Gobbi s.r.l sulla coltura

VEDERE ANCHE LA SCHEDA GENERALE ORTICOLTURA

EPOCA	PRODOTTO	DOSE	Somministrazione	NOTE
TRAPIANTO A DIMORA	<b>Alga Special</b>	<b>2 l/1000 m<sup>2</sup></b>	Fertirrigazione	Per una pronta ripresa e permettere alla piantina di superare la crisi di trapianto.
	<b>Stimolante 66f + Gerfos-K</b>	<b>20 ml/hl 300 ml/hl</b>	Per via fogliare	Ripetere ogni 15-20 giorni
NEL PERIODO CHE SEGUE SINO ALLA FIORITURA	<b>Stimolante 66f + Alga Special + Sprühdünger tipo 26</b>	<b>20 ml/hl 100 ml/hl 50 g/hl</b>	Per via fogliare	Per favorire la crescita rapida ed equilibrata delle piante. Intervenire a cadenza settimanale.
PREFIORITURA	<b>Stimolante 66f + Alga Special + EG 118</b>	<b>20 ml/hl 100 ml/hl 200 ml/hl</b>	Per via fogliare	Per migliorare la germinabilità del polline e per predisporre la pianta ad una buona allegagione. Ripetere il trattamento settimanalmente.
	<b>Alga Special + Sprühdünger tipo 5 + Gerhumin</b>	<b>2 l/1000 m<sup>2</sup> 1-2 kg/1000 m<sup>2</sup> 1 l/1000 m<sup>2</sup></b>	Per via radicale	
IN FIORITURA, OGNI QUALVOLTA UN NUMERO SUFFICIENTE DI FIORI GIUSTIFICHI IL TRATTAMENTO	<b>Auxiger*</b>	<b>50-70 ml/hl</b>	Per via fogliare Per via fogliare irrorare tutta la pianta	Per aumentare il numero di frutti allegati quando, a causa della temperatura, la fecondazione non si svolge regolarmente e per aumentare la pezzatura dei frutti regolarmente fecondati.
DOPO QUALCHE GIORNO	<b>Stimolante 66f + Alga Special + Sprühdünger tipo 26</b>	<b>20 ml/hl 100 ml/hl 50 g/hl</b>	Per via fogliare	
	<b>Auxiger*</b>	<b>50-70 ml/hl</b>	Per via fogliare	Per favorire l'ingrossamento dei frutti e una maturazione più uniforme ed equilibrata. Intervenire periodicamente.

Nota : L'**Auxiger** si può usare anche per via radicale (200 ml/1000 m<sup>2</sup>) Effettuare la prima applicazione quando le piante sono al terzo palco di pomodori e il diametro medio dei frutti sia all'incirca come quello di un uovo di gallina. Ripetere ogni 8-10 giorni fino alla fine del ciclo.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.  
Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

Carenze: Per la prevenzione del marciume apicale.

EPOCA	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3	
Qualche giorno dopo i trattamenti alleganti	<b>Alga Special</b> 150 ml/hl <b>TRB 124</b> 750 g/hl oppure	<b>Alga Special + Calcium 44 LG</b>	150 ml/hl 80-100 g/hl oppure	<b>Alga Ca</b> 500 ml/hl Per via fogliare.

