



## Consigli per il migliore utilizzo dei prodotti L. Gobbi s.r.l sulla coltura

### 1. PIANTINE A CRESCITA "LENTA" (es.: peperone, sedano).

I seguenti interventi presuppongono una normale dotazione di elementi nutritivi ed un pH ottimale nel substrato di coltivazione. Nell'eventualità aggiungere il **Dünger 40** alla dose di 3 kg per m<sup>3</sup> di substrato.

È, in ogni caso, sempre consigliabile l'aggiunta di **1 l di Geros-K**.

EPOCA	PRODOTTO	DOSE	Somministrazione	NOTE
1° FASE: DALLA GERMINAZIONE ALLA PRIMA FOGLIA VERA	<b>Seaweed Mix</b> <b>+ Dünger 40</b> <b>+ TRB 124</b>	<b>400 ml/1000 m<sup>2</sup></b> <b>2 kg/1000 m<sup>2</sup></b> <b>1 kg/1000 m<sup>2</sup></b>	Per via radicale	2 volte per settimana per trattamenti giornalieri ridurre il dosaggio proporzionalmente.
	<b>Stimolante 66f</b> <b>+ Geros-K</b>	<b>20 ml/hl</b> <b>50 ml/hl</b>	Per via fogliare	Trattare settimanalmente
2° FASE: DALLA PRIMA FOGLIA VERA A CIRCA 15 GIORNI PRIMA DEL TRAPIANTO	<b>Dünger 40</b> <b>+ Gerhumin</b>	<b>3 kg/1000 m<sup>2</sup></b> <b>500 ml/1000 m<sup>2</sup></b>	Per via radicale	2 volte per settimana per trattamenti giornalieri ridurre il dosaggio proporzionalmente.
	<b>Stimolante 66f</b> <b>+ Geros-K</b>	<b>20 ml/hl</b> <b>50 ml/hl</b>	Per via fogliare	Trattare settimanalmente
3° FASE: DA CIRCA 15 GIORNI PRIMA DEL TRAPIANTO	<b>Dünger 10</b> (o Dünger 60) <b>+ Gerhumin</b>	<b>3 kg/1000 m<sup>2</sup></b> (3 kg/1000 m <sup>2</sup> ) <b>500 ml/1000 m<sup>2</sup></b>	Per via radicale	2 volte per settimana per trattamenti giornalieri ridurre il dosaggio proporzionalmente.
	<b>Stimolante 66f</b> <b>+ Geros-K</b>	<b>20 ml/hl</b> <b>50 ml/hl</b>	Per via fogliare	Trattare settimanalmente

### 2. PIANTINE A CRESCITA "RAPIDA" (es.: pomodoro, lattuga, ecc.).

I seguenti interventi presuppongono una normale dotazione di elementi nutritivi ed un pH ottimale nel substrato di coltivazione.

Nell'eventualità aggiungere il **Dünger 50** alla dose di 3 kg per m<sup>3</sup> di substrato.

È, in ogni caso, sempre consigliabile l'aggiunta di **1 l di Geros-K**.

EPOCA	PRODOTTO	DOSE	Somministrazione	NOTE
1° FASE: DALLA GERMINAZIONE ALLA PRIMA FOGLIA VERA	<b>Seaweed Mix</b> <b>+ Dünger 40</b> <b>+ TRB 124</b>	<b>400 ml/1000 m<sup>2</sup></b> <b>1 kg/1000 m<sup>2</sup></b> <b>1 kg/1000 m<sup>2</sup></b>	Fertirrigazione	2 volte per settimana per trattamenti giornalieri ridurre il dosaggio proporzionalmente.
	<b>Stimolante 66f</b> <b>+ Geros-K</b>	<b>20 ml/hl</b> <b>50 ml/hl</b>	Per via fogliare	Trattare settimanalmente
2° FASE: DALLA PRIMA FOGLIA VERA A CIRCA 15 GIORNI PRIMA DEL TRAPIANTO	<b>Dünger 50</b> <b>+ Gerhumin</b>	<b>3 kg/1000 m<sup>2</sup></b> <b>500 ml/1000 m<sup>2</sup></b>	Per via radicale	2 volte per settimana per trattamenti giornalieri ridurre il dosaggio proporzionalmente.
	<b>Stimolante 66f</b> <b>+ Geros-K</b>	<b>20 ml/hl</b> <b>50 ml/hl</b>	Per via fogliare	Trattare settimanalmente
3° FASE: DA CIRCA 15 GIORNI PRIMA DEL TRAPIANTO	<b>Dünger 30</b> <b>+ Gerhumin</b>	<b>3 kg/1000 m<sup>2</sup></b> <b>500 ml/1000 m<sup>2</sup></b>	Per via radicale	2 volte per settimana per trattamenti giornalieri ridurre il dosaggio proporzionalmente.
	<b>Stimolante 66f</b> <b>+ Geros-K</b>	<b>20 ml/hl</b> <b>50 ml/hl</b>	Per via fogliare	Trattare settimanalmente

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

