



Consigli per il migliore utilizzo dei prodotti L. Gobbi s.r.l sulla coltura

VEDERE ANCHE LA SCHEDA GENERALE ORTICOLTURA

EPOCA	PRODOTTO	DOSE	Somministrazione	NOTE
TRAPIANTO A DIMORA	Alga Special	2 l/1000 m²	Fertirrigazione	Per una pronta ripresa e permettere alla piantina di superare la crisi di trapianto.
	Stimolante 66f + Gerfos-K	20 ml/hl 300 ml/hl	Per via fogliare	Ripetere ogni 15-20 giorni
NEL PERIODO CHE SEGUE	Stimolante 66f + Sprühdünger tipo 27 + Gerhumin	20 ml/hl 50 g/hl 50 ml/hl	Per via fogliare	Per favorire la crescita rapida ed equilibrata delle piante. Intervenire a cadenza settimanale.
FIORITURA	Auxiger + Alga Special	50-70 ml/hl 100 ml/hl	Per via fogliare	Per favorire l'allegagione. Intervenire durante la fioritura, ogni 8-10 giorni.
4-5 GIORNI DOPO	Stimolante 66f + Alga Special + Sprühdünger tipo 26 + Boro LG 25	20 ml/hl 100 ml/hl 50 g/hl 400 ml/hl	Per via fogliare	
	Sprühdünger tipo 26 + Boro LG 25 + Gerhumin	2 kg/1000 m² 4 l/1000 m² 1 l/1000 m²	Per via radicale	
ALLEGAGIONE / INIZIO MATURAZIONE	Auxiger + Seaweed Mix + Sprühdünger tipo 5	50-70 ml/hl 200 ml/hl 50 g/hl	Per via fogliare	Per favorire l'ingrossamento dei frutti ed una maturazione più uniforme ed equilibrata.
	Fluidünger Più + Gerhumin	10 l/1000 m² 1 l/1000 m²	Per via radicale	
INIZIO RACCOLTA	Sprühdünger tipo 5 + Gerhumin	100 g/hl 50 ml/hl	Per via fogliare	Per soddisfare le elevate esigenze di potassio che la pianta di zucchini ha in questa fase. In mancanza di tali apporti ci sarebbero gravi ripercussioni qualitative sulla produzione.
	Fluidünger Più + Gerhumin	10 l/1000 m² 1 l/1000 m²	Per via radicale	

*Nota: **L'Auxiger** si può usare anche per via radicale (200 ml/1000 m²) da quando compaiono i primi fiori chiusi. Ripetere ogni 7 giorni fino alla fine del ciclo.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

