


SCHEDE NUTRIZIONALI

Consigli per il migliore utilizzo dei prodotti L. Gobbi s.r.l sulla coltura



EPOCA	PRODOTTO	DOSE	Somministrazione	NOTE
Primavera precoce	LG 81	4-6 L/ha	Per via radicale	Migliora l'attività biologica del terreno e quella radicale. Migliora l'assorbimento del calcio.
ogni mese (o a metà dose ogni 15 giorni) <i>oppure metà estate</i>	LG 81	1 L/ha	In fertirrigazione sulla fila	
		6 L/ha	<i>Intera superficie coltivata</i>	
Germogliamento (germogli lunghi circa 10 cm)	Anticlor Fe WP6 G + Gerhumin	40-60 g/pianta 30 ml/hl	Per via radicale	Per prevenire la clorosi ferrica
	Alga Special + Sprühdünger 27	2 L/ha 750 g/ha	Per via fogliare	
Prefioritura/inizio fioritura	Alga BFeMn	2 L/ha	Per via fogliare	Per migliorare l'allegagione. Ripetere i trattamenti un paio di volte ciascuno.
Inizio fioritura/Caduta petali	Alga Special + Sprühdünger 26	2 L/ha 750 g/ha	Per via fogliare	
10 giorni dalla piena fioritura	Alga Ca	3 L/ha	Per via fogliare	Per migliorare la qualità del futuro frutto elevandone il contenuto zuccherino, la pezzatura e la serbevolezza
25 giorni dalla piena fioritura	Alga Ca	3 L/ha	Per via fogliare	
Inizio ingrossamento frutti	Alga Special + Sprühdünger 26	2 L/ha 750 g/ha	Per via fogliare	Ripetere il trattamento almeno due volte a distanza di circa 10 giorni
40 giorni dalla piena fioritura	Alga Ca	3 L/ha	Per via fogliare	Per migliorare la qualità del futuro frutto elevandone il contenuto zuccherino, la pezzatura e la serbevolezza
Da allegagione avvenuta	Alga Special + Sprühdünger 5 (o Sprühdünger 30)	2 L/ha 750 g/ha (750 g/ha)	Per via fogliare	Ripetere ogni 15 giorni
Subito dopo la raccolta	Alga Special + Energemma	3 L/ha 2 kg/ha	Per via fogliare	Si favorisce l'accumulo per una pronta disponibilità nelle primissime fasi della stagione successiva
20-30 giorni prima della data attesa di caduta foglie e comunque dopo la raccolta.	Blattab	8 kg/ha	Per via fogliare	Promuove la caduta delle foglie e la maturazione del legno. L'effetto dell'applicazione del prodotto comporta anche una migliorata resistenza al gelo. (Utilizzare 10 hL/ha di acqua)
10-14 giorni dopo		8 kg/ha	Per via fogliare	
Dopo caduta foglie	LG 81	4-6 L/ha	Per via radicale	Migliora l'attività biologica del terreno e quella radicale. Migliora l'assorbimento e l'accumulo dei nutrienti.

Controllo delle emissioni di eccessi vegetativi.	Brafix	q.b.	Spennellato	Applicare con una spatola o un pennello su tagli di potatura di grandi dimensioni e quando è necessario regolare lo sviluppo vegetativo eccessivo.
Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.				

Il trattamento con il **Blattab** promuove la caduta delle foglie, la maturazione del legno e aumenta la resistenza delle piante al gelo. Conseguentemente, al manifestarsi delle prime gelate, le piante, ormai completamente a riposo, subiranno meno ferite riducendo le possibilità di infezioni da **PSA**, anche per il contenuto in rame del prodotto.

Note ai prodotti elencati:

Alga Special può essere sostituita da **Seaweed Mix** (stessi dosaggi).

Sulla brochure della linea **Biotrissol** possono essere reperiti numerosi altri prodotti che trovano valido impiego sulla coltura. La linea **Biotrissol** si distingue per possedere come base, una matrice organica (aminoacidi e estratti vegetali fermentati) e per la possibilità per la maggior parte dei prodotti, di poter essere utilizzati anche in **agricoltura biologica**.



l.gobbi srl

Via Vallecaldà, 33 - 16013 Campo Ligure (GE) - ITALY

Tel.: +39 010 920 395 - Fax: +39 010 921 400

E-mail: info@lgobbi.it - <http://www.lgobbi.it>

Conc. E. Gerlach GmbH - Germany