



Consigli per il migliore utilizzo dei prodotti L. Gobbi s.r.l

Vedere anche la scheda Generale FRUTTICOLTURA

EPOCA	PRODOTTO	DOSE	Somministrazione	NOTE
Primavera precoce	LG 81	4-6 L/ha	Per via radicale	Migliora l'attività biologica del terreno e quella radicale. Migliora l'assorbimento del calcio.
Ogni mese (o a metà dose ogni 15 giorni)	LG 81	1 L/ha	In fertirrigazione sulla fila	
<i>oppure metà estate</i>		6 L/ha	Intera superficie coltivata	
Pre fioritura	Alga Mix BMg +Sprühdünger tipo 26	2,5 L/ha 750 g/ha	Per via fogliare	Per predisporre la pianta ad una migliore allegazione
A inizio fioritura	Alga Mix BMg +Sprühdünger tipo 26	2,5 L/ha 750 g/ha	Per via fogliare	Per migliorare l'allegazione
A caduta petali	Alga Mix BMg +Sprühdünger tipo 26	2,5 L/ha 750 g/ha	Per via fogliare	Per migliorare l'allegazione
Da scamiciatura ogni 15 gg per almeno 4 volte	Alga Ca +Sprühdünger tipo 5 (o Sprühdünger tipo 30)	2,5-3 L/ha 750 g/ha (750 g/ha)	Per via fogliare	Per migliorare la consistenza della polpa
Dopo diradamento frutti	Multibrix	3 L/ha	Per via fogliare	2-3 trattamenti. Il secondo può essere eseguito in miscela con il primo trattamento di RedSkin LG (miscela estemporanea all'invaiaura).
Immediatamente prima di inizio indurimento del tegumento seminale.	Maxim	12 cp/ha	Per via fogliare	Incremento della pezzatura dei frutti
Da inizio invaiatura fino a una settimana prima della raccolta	RedSkin LG	3 L/ha	Per via fogliare	Ad intervalli tali da poter eseguire 2-4 trattamenti totali. Il primo può essere eseguito in miscela con l'ultimo di Multibrix (miscela estemporanea all'invaiaura)
Dopo la raccolta	Seaweed Mix +Energemma	2 L/ha 2 kg/ha	Per via fogliare	Si favorisce l'accumulo per una pronta disponibilità nelle primissime fasi della stagione successiva
Dopo la caduta foglie	LG 81	4-6 L/ha	Per via radicale	Migliora l'attività biologica del terreno e quella radicale. Migliora l'assorbimento e l'accumulo dei nutrienti.

Note ai prodotti elencati:

Alga Mix BMg (2,5 L/ha) può essere sostituita dalla miscela **Alga Special** (2-3 L/ha) + **Boron 21 PG** (1 kg/ha)

Boron 21 PG (1 kg/ha) può essere sostituito da **Boro LG 25** (2,5 L/ha) o da **Boro 10 LG** (1 L/ha).

Seaweed Mix può essere sostituita da **Alga Special** (stessi dosaggi).

Al posto di **Sprühdünger Tipo 5** si può impiegare lo **Sprühdünger Tipo 30** che possiede un più elevato contenuto di potassio

Sulla brochure della linea **Biotrissol** possono essere reperiti numerosi altri prodotti che trovano valido impiego sulla coltura. La linea **Biotrissol** è caratterizzata dal possedere, come base, una matrice organica (aminoacidi e estratti vegetali fermentati) e dalla possibilità, data dalla maggior parte dei prodotti, di essere impiegati anche in **AGRICOLTURA BIOLOGICA**.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.



I- 16013 Campo Ligure (GE) Via Vallecaldà,
33
Tel.: +39 010 920 395 Fax : +39 010 921 400
e-mail: info@lgobbi.it http://www.lgobbi.it
SPECIALITÀ PER L'AGRICOLTURA

l. gobbi s.r.l.



Conc. E. Gerlach GmbH - Germania

SCHEDE NUTRIZIONALI

ALBICOCCO



Consigli per il migliore utilizzo dei prodotti L. Gobbi s.r.l



I- 16013 Campo Ligure (GE) Via Vallecaldà,
33
Tel.: +39 010 920 395 Fax : +39 010 921 400
e-mail: info@lgobbi.it <http://www.lgobbi.it>
SPECIALITÀ PER L'AGRICOLTURA

l. gobbi s.r.l.



Conc. E. Gerlach GmbH - Germania