



BIETOLA DA ZUCCHERO

- PROGRAMMA ATTO AD AUMENTARE IL GRADO POLARIMETRICO E LA RESA IN RADICI -

STADIO VEGETATIVO	PRODOTTO	DOSI	INDICAZIONI
Da 4 foglie → Rosetta 	Stimolante 66f	0.3 l/ha	Effettuare almeno 2 interventi in miscela con i trattamenti erbicidi di post-emergenza
Ingrossamento del fittone 	Stimolante 66f + Sprühdünger Tipo 5	0.3 l/ha + 0.75 Kg/ha	Intervenire con 1-2 applicazioni a distanza di 10 – 15 giorni, in corrispondenza degli eventuali trattamenti anticercosporici

- CONTROLLO DELLE PRINCIPALI CARENZE E FISIOPATIE -

Intervenire alla comparsa dei primi sintomi effettuando almeno 2 interventi a distanza di 10 – 15 giorni

CARENZA - FISIOPATIA	PRODOTTO	DOSI	INDICAZIONI
BORO	Boro 10 LG	1.5 - 2 Kg/ha	Visto la diffusione di tale carenza si consiglia di effettuare interventi sistematici associati al precedente Programma
Manganese	Mangan 32 PG	1 Kg/ha	
Magnesio	Magnesium 16 PG	5 - 8 Kg/ha	
Multicarenze	EG 118	3 – 4 Kg/ha	Utilizzare questo formulato in presenza di carenze multiple e/o non ben riconducibili ad un solo elemento.
Azoto	Sprühdünger Tipo 27 (*)	750 g/ha	(*) Dopo le 6-8 foglie è da preferirsi lo Sprühdünger Tipo 5
Terreni mal strutturati (lavorazione intempestive, ristagni idrici, et.)	Stimolante 66f + Sprühdünger Tipo 27 (*)	300 ml/ha + 750 g/ha	Ingiallimenti fogliari simili a carenza di azoto. (*) Dopo le 6-8 foglie è da preferirsi lo Sprühdünger Tipo 5

Nei trattamenti anticarenziali si consiglia la miscela con ALGA SPECIAL in ragione di 2 – 3 L/ha , ove non sia già indicato il formulato Stimolante 66f



l.gobbi

Via Vallecaldà, 33 - 16013 Campo Ligure (GE)
e-mail: info@lgobbi.it Tel.: 010.920.395 Fax: 010.921.400

BIETOLA DA ZUCCHERO

COLTURA DA SEME

STADIO VEGETATIVO	MODALITA' D'IMPIEGO	PRODOTTO	DOSI	SCOPO
Pre - trapianto	Applicare il formulato sull'apparto radicale per immersione o sull'intera pianta con irroratore	Stimolante 66f	20 ml/hl	Aiutare la pianta a superare la fase di post - trapianto
Durante l'intera fase di accrescimento	Intervenire 3 - 4 volte ogni 15 - 20 gg.	Stimolante 66f + Dünger 20	20 ml/hl + 150 g/hl	Favorire un buon sviluppo vegetativo e una rapido passaggio alla fase riproduttiva

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.



l.gobbi

Via Vallecaldà, 33 - 16013 Campo Ligure (GE)
e-mail: info@lgobbi.it Tel.: 010.920.395 Fax: 010.921.400