

Schede nutrizionali

CILIEGIO



Consigli per il migliore utilizzo dei prodotti L. Gobbi s.r.l

| EPOCA | PRODOTTO | DOSE | Somministrazione | NOTE |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| Primavera precoce | LG 81 | 4-6 l/ha | Per via radicale | Migliora l'attività biologica del terreno e quella radicale. Migliora l'assorbimento del calcio. |
| ogni mese (o a metà dose ogni 15 giorni) oppure metà estate | LG 81 | 1 l/ha | In fertirrigazione sulla fila | |
| | | 6 l/ha | <i>Intera superficie coltivata</i> | |
| Prefioritura | Alga Mix BMg | 2,5 l/ha | Per via fogliare | Per migliorare la allegazione |
| Ad inizio fioritura | Alga Mix BMg | 2,5 l/ha | Per via fogliare | Per migliorare la pezzatura |
| Da post-fioritura | Alga Ca | 3 l/ha | Per via fogliare | Per prevenire la spaccatura dei frutti Effettuare 3 trattamenti ad intervalli regolari fino a pre-invaiaura. |
| 75% caduta petali | Geramid Neu N-Biotrissol | 1,5-2 l/ha 2-3 l/ha | Per via fogliare | Selezione dei frutti migliori |
| Fine caduta petali | Alga Mix BMg | 2,5 l/ha | Per via fogliare | Per migliorare la pezzatura e prevenire la cascola di maggio. |
| Ad allegazione avvenuta e fino all'invaiaura | Sprühdünger tipo 5 | 750 g/ha | Per via fogliare | Effettuare 3-4 trattamenti a distanza di 7-10 giorni. |
| Pre invaiatura | Seaweed Mix +Calcium 44 LG | 2 l/ha 1 l/ha | Per via fogliare | Per prevenire la spaccatura dei frutti. Effettuare 2 trattamenti. |
| Dall'invaiaura alla raccolta | Kalidos LG o Platina* | 1,5 l/ha | Per via fogliare | Per prevenire la spaccatura dei frutti. Max 4 trattamenti. |
| Post-raccolta | Seaweed Mix Energemma | 2 L/ha 2 kg/ha | Per via fogliare | Migliora l'accumulo dei nutrienti per l'annata successiva. |
| Dopo la caduta foglie | LG 81 | 4-6 l/ha | Per via radicale | Migliora l'attività biologica del terreno e quella radicale. Migliora l'assorbimento e l'accumulo dei nutrienti. |

*Per l'applicazione del **Platina** consultare la brochure specifica

Note ai prodotti elencati:

Alga Mix BMg (2,5 l/ha) può essere sostituita dalla miscela **Alga Special** (2-3 l/ha) + **Boron 21 PG** (1 kg/ha)

Boron 21 PG (1 kg/ha) può essere sostituito da **Boro LG 25** (2,5 l/ha) o da **Boro 10 LG** (1 l/ha).

Seaweed Mix può essere sostituita da **Alga Special** (stessi dosaggi).

Al posto di **Sprühdünger Tipo 5** si può impiegare lo **Sprühdünger Tipo 30** che possiede un più elevato contenuto di potassio

Sulla brochure della linea **Biotrissol** possono essere reperiti numerosi altri prodotti che trovano valido impiego sulla coltura. La linea **Biotrissol** è caratterizzata dal possedere, come base, una matrice organica (aminoacidi e estratti vegetali fermentati) e dalla possibilità, data dalla maggior parte dei prodotti, di essere impiegati anche in **AGRICOLTURA BIOLOGICA**.



l.gobbi srl

Via Vallecaldà, 33 - 16013 Campo Ligure (GE) - ITALIA
www.lgobbi.it - Tel.: +39 010 920395 - Fax: +39 010 921400
Conc. E. Gerlach GmbH - Germania