



## Consigli per il migliore utilizzo dei prodotti L. Gobbi s.r.l

EPOCA	PRODOTTO	DOSE	Somministrazione	NOTE
Primavera precoce	LG 81	4-6 l/ha	Per via radicale	Migliora l'attività biologica del terreno e quella radicale. Migliora l'assorbimento del calcio.
ogni mese (o a metà dose ogni 15 giorni) oppure metà estate	LG 81	1 l/ha	In fertirrigazione sulla fila	
		6 l/ha	Intera superficie coltivata	
Prefioritura	Alga Mix BMg	2,5 l/ha	Per via fogliare	Per migliorare la allegagione
Ad inizio fioritura	Alga Mix BMg	2,5 l/ha	Per via fogliare	Per migliorare la pezzatura
Da post-fioritura	Alga Ca	3 l/ha	Per via fogliare	Per prevenire la spaccatura dei frutti Effettuare 3 trattamenti ad intervalli regolari fino a pre-invaiaitura.
75% caduta petali	Geramid Neu N-Biotrissol	1,5-2 l/ha 2-3 l/ha	Per via fogliare	Selezione dei frutti migliori
Fine caduta petali	Alga Mix BMg	2,5 l/ha	Per via fogliare	Per migliorare la pezzatura e prevenire la cascola di maggio.
Ad allegagione avvenuta e fino all'invaiaitura	Sprühdünger tipo 5	750 g/ha	Per via fogliare	Effettuare 3-4 trattamenti a distanza di 7-10 giorni.
Pre invaiaitura	Seaweed Mix +Calcium 44 LG	2 l/ha 1 l/ha	Per via fogliare	Per prevenire la spaccatura dei frutti. Effettuare 2 trattamenti.
Dall'invaiaitura alla raccolta	Platina*	1,5 l/ha	Per via fogliare	Per prevenire la spaccatura dei frutti. Max 4 trattamenti.
Post-raccolta	Seaweed Mix Energemma	2 L/ha 2 kg/ha	Per via fogliare	Migliora l'accumulo dei nutrienti per l'annata successiva.
Dopo la caduta foglie	LG 81	4-6 l/ha	Per via radicale	Migliora l'attività biologica del terreno e quella radicale. Migliora l'assorbimento e l'accumulo dei nutrienti.

\*Per l'applicazione del **Platina** consultare la brochure specifica

Note ai prodotti elencati:

**Alga Mix BMg** (2,5 l/ha) può essere sostituita dalla miscela **Alga Special** (2-3 l/ha) + **Boron 21 PG** (1 kg/ha)

**Boron 21 PG** (1 kg/ha) può essere sostituito da **Boro LG 25** (2,5 l/ha) o da **Boro 10 LG** (1 l/ha).

**Seaweed Mix** può essere sostituita da **Alga Special** (stessi dosaggi).

Al posto di **Sprühdünger Tipo 5** si può impiegare lo **Sprühdünger Tipo 30** che possiede un più elevato contenuto di potassio

Sulla brochure della linea **Biotrissol** possono essere reperiti numerosi altri prodotti che trovano valido impiego sulla coltura. La linea **Biotrissol** è caratterizzata dal possedere, come base, una matrice organica (aminoacidi e estratti vegetali fermentati) e dalla possibilità, data dalla maggior parte dei prodotti, di essere impiegati anche in **AGRICOLTURA BIOLOGICA**.

