



## Consigli per il migliore utilizzo dei prodotti L. Gobbi s.r.l sulla coltura

EPOCA	PRODOTTO	DOSE	Somministrazione	NOTE
Primavera precoce	LG 81	4-6 l/ha	Per via radicale	Migliora l'attività biologica del terreno e quella radicale. Migliora l'assorbimento del calcio.
Ogni mese (o a metà dose ogni 15 giorni)	LG 81	1 l/ha	In fertirrigazione sulla fila	
<i>Oppure metà estate</i>		6 l/ha	<i>Intera superficie coltivata</i>	
Ad inizio fioritura	Stimolante 66f + Alga Mix BMg + Sprühdünger tipo 26 o 27	300 ml/ha 3 l/ha 750 g/ha	Per via fogliare	
Dalla scamicatura e per tutto il periodo di divisione cellulare ogni 10-15 gg.	Auxiger + Alga Special	500 ml/ha 2 l/ha	Per via fogliare	Per migliorare la pezzatura dei frutti.
Nello stesso periodo, a frutticini ingrossati	Stimolante 66f + Alga Mix BMg + Sprühdünger tipo 26 o 5	300 ml/ha 3 kg/ha 750 g/ha	Per via fogliare	
Da allegazione ad invaatura	Stimolante 66f + Alga Ca + Sprühdünger tipo 5 o 30	300 ml/ha 3 l/ha 750 g/ha	Per via fogliare	Ogni 15 giorni. Per migliorare le caratteristiche organolettiche, la pezzatura dei frutti e la loro colorazione
Dopo la raccolta	Seaweed Mix +Energemma	2 L/ha 2 kg/ha	Per via fogliare	Si favorisce l'accumulo per una pronta disponibilità nelle primissime fasi della stagione successiva
Autunno	LG 81	6 l/ha	per via radicale	Migliora l'attività biologica del terreno e quella radicale. Migliora l'assorbimento e l'accumulo dei nutrienti.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.  
Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

