


Schede nutrizionali

Consigli per il migliore utilizzo dei prodotti L. Gobbi s.r.l su:



VITE: Uva da vino

Vedere anche la scheda Generale FRUTTICOLTURA

EPOCA	PRODOTTO	DOSE	SOMMINISTRAZIONE	NOTE
Primavera precoce	LG 81	4-6 L/ha	Per via radicale	Migliora l'attività biologica del terreno e quella radicale. Migliora l'assorbimento del calcio.
ogni mese	LG 81	1 L/ha	In fertirrigazione sulla fila	
(o a metà dose ogni 15 giorni) <i>oppure metà estate</i>		6 L/ha	Intera superficie coltivata	
Da germogli lunghi 8-10 cm fino a grappoli separati	Stimolante 66f (o alga Special) + Sprühdünger Tipo 27	300 ml/ha (2 L/ha) 750 g/ha	Per via fogliare	Per favorire lo sviluppo dei germogli ed incrementare la superficie fogliare. Ripetere i trattamenti ogni 10-15 giorni anche in miscela ai normali trattamenti antiparassitari.
Tra bottoni fiorali separati e Inizio fioritura	Alga Mix BMg + Sprühdünger Tipo 27	3 L/ha 750 g/ha	Per via fogliare	Per migliorare la germinabilità del polline e predisporre la pianta ad una buona allegagione. Per stimolare la separazione degli acini. 2 trattamenti.
Spollonatura	Spollonante G	1 L/10 litri di acqua	Per via fogliare	Per il controllo dei polloni radicali Cercando di colpire solo i polloni quando abbiano raggiunto un'altezza media di circa 20 cm.
Inizio fioritura	Sprühdünger Tipo 26	750 g/ha	Per via fogliare	Per migliorare l'allegagione. 2 trattamenti.
Caduta caliptre	Alga Mix BMg	2,5 L/ha		
Inizio chiusura grappolo	Alga Ca	2 l/ha	Per via fogliare	Ripetere ogni 10-15 giorni per 3-4 volte.
Chiusura del grappolo	Sprühdünger Tipo 30	2 l/ha 750 g/ha	Per via fogliare	Per favorire l'incremento del tenore zuccherino.
Inizio invaiatura	Zn-Golden Biotrissol + Sprühdünger Tipo 30	1 L/ha 750 g/ha	Per via fogliare	Per una migliore lignificazione dei tralci ed una anticipata maturazione associata ad una intensificazione della colorazione.
25% invaiatura	Ca-Mg Biotrissol	2,5 L/ha	Per via fogliare	Prevenzione del "disseccamento del rachide".
15-20 giorni prima della data attesa di caduta foglie e comunque dopo la raccolta.	Blattab Se in soluzione unica	24 kg/ha (=1,6 kg/hl)	Per via fogliare	Promuove la caduta delle foglie e la maturazione del legno. L'effetto dell'applicazione del prodotto comporta anche una migliorata resistenza al gelo. Utilizzare 15 hl/ha di acqua.
	Blattab Se in due trattamenti a distanza di 7-8 giorni	12 kg/ha (=0,8 kg/hl)	Per via fogliare	
Autunno	LG 81	6 l/ha	Per via radicale	Migliora l'attività biologica del terreno e quella radicale. Migliora l'assorbimento e l'accumulo dei nutrienti.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.



l.gobbi srl

Via Vallecaldà, 33 - 16013 Campo Ligure (GE) – ITALIA - Tel.: +39 010 920 395 - Fax: +39 010 921 400
E-mail: info@lgobbi.it - <http://www.lgobbi.it> - Conc. E. Gerlach GmbH - Germania